

Tumorregister München



- ▶ Inzidenz und Mortalität
- ▶ Auswahlmatrix
- ▶ Homepage
- ▶ English

P-NET: Neuroendokr. Pankreastu.

Survival

Diagnosejahr	1989-1997	1998-2019
Patienten	21	650
Erkrankungen	21	650
Fälle in Auswertung	21	503
Erstellungsdatum	19.10.2020	
Datenbankexport	12.08.2020	
Population	4,86 Mio.	



Tumorregister München
Bayerisches Krebsregister - Regionalzentrum München
am Klinikum Großhadern/IBE
Marchioninstr. 15
81377 München
Deutschland

<https://www.tumorregister-muenchen.de>

<https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/shPNETG-P-NET-Neuroendokr.-Pankreastu.-Survival.pdf>

Index der Abbildungen und Tabellen

Abb./Tab.		Seite
1a	Relatives Überleben nach Diagnosezeitraum (Grafik)	3
1b	Überleben nach Diagnosezeitraum (Tabelle)	3
2a	Überleben nach Geschlecht (Grafik)	4
2b	Überleben nach Geschlecht (Tabelle)	4
3a	Relatives Überleben nach Altersgruppe (Grafik)	5
3b	Überleben nach Altersgruppe (Tabelle)	5
5a	Zeit bis zur ersten Progression (CI) (Grafik)	6
5b	Zeit bis zur ersten Progression (Tabelle)	6
5c	Beobachtetes Überleben ab Progression (Grafik)	7
5d	Beobachtetes Überleben ab Progression (Tabelle)	7
5e	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Grafik)	8
5f	Beobachtetes Überleben ab Progression nach Zeitraum Progression (Tabelle)	8




Abb. 1a. Relatives Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Diagnosezeitraum. In der Auswertung befinden sich 504 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1989 bis 2019.

Die farbigen Symbole repräsentieren zum Vergleich die Survival-Ergebnisse des SEER-Programms (Surveillance, Epidemiology, and End Results) des National Cancer Institute (NCI) der USA, zusammengefasst für die Diagnosejahrgänge 2000 bis 2016.

Eingeschlossen sind alle mit klinischen Daten registrierten Patienten, also keine DCO-Fälle. Die Daten ab 1998 haben mit dieser DCO-Einschränkung einen Bevölkerungsbezug. Die historischen Daten der vorausgehenden Perioden können stark selektiert sein, so dass univariate Vergleiche der dargestellten Zeitperioden nur mit Vorsicht zu interpretieren sind. Die verschiedenen Zeitperioden werden dennoch aufbereitet, um insbesondere den Langzeitverlauf des relativen Überlebens im Vergleich zu anderen Tumoren zugänglich zu machen.

Jahre	Diagnosezeitraum					
	1988-1997 n=21		1998-2006 n=78		ab 2007 n=405	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
1			83.3	83.7	79.0	80.2
2			71.6	73.7	72.3	74.2
3			65.1	67.8	65.5	68.4
4			58.6	62.3	62.4	66.1
5			57.3	60.7	57.8	62.3
Median			7.2		8.9	

Tab. 1b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Diagnosezeitraum im Zeitraum 1989-2019 (N=504).




Abb. 2a. Beobachtetes, erwartetes und relatives Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Geschlecht. In der Auswertung befinden sich 483 Patienten aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2019.

Jahre	Geschlecht			
	Männlich n=262		Weiblich n=221	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	78.8	80.2	81.0	81.9
2	67.8	69.9	77.2	78.9
3	61.1	64.2	70.6	73.0
4	57.9	62.0	65.9	68.9
5	52.9	57.4	63.6	67.4
6	50.9	56.1	59.3	64.1
7	46.4	52.2	56.1	61.7
8	44.6	51.2	54.5	60.8
9	43.4	50.7	52.4	59.7
10	42.1	49.3	50.1	57.2
11	37.6	45.7		
12	37.6	45.3		
Median	6.2		10.2	

Tab. 2b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Geschlecht im Zeitraum 1998-2019 (N=483).




Abb. 3a. Relatives Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Altersgruppe. In der Auswertung befinden sich 483 Patienten aus den Diagnosejahren 1998 bis 2019.

Jahre	Altersgruppe			
	< 60 J. n=209		>=60 J. n=274	
	beob. %	rel. %	beob. %	rel. %
0	100.0	100.0	100.0	100.0
1	90.3	90.6	71.9	73.7
2	83.5	83.6	63.6	66.5
3	77.6	78.2	56.4	60.6
4	73.0	73.3	53.0	58.8
5	70.3	71.4	48.7	55.1
Median	12.9		4.9	

Tab. 3b. Beobachtetes (beob.) und relatives (rel.) Überleben für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. nach Altersgruppe im Zeitraum 1998-2019 (N=483).




Abb. 5a. Zeit bis zum ersten Progressionsereignis für 299 Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2019 (bei soliden Tumoren nur M0) geschätzt als kumulative Inzidenzfunktion (CI, durchgezogene Linie) mit Tod als konkurrierendes Risiko und als umgekehrter Kaplan-Meier-Schätzer (1-KM, gestrichelte Linie). Die Häufigkeit der Ereignisse kann aufgrund von Untererfassung unterschätzt sein.

		Progressionsform	
		Alle Progredienten (CI)	Alle Progredienten (1-KM)
N		299	299
Events		100	100
konkurr.		14	
Jahre		%	%
0		0.0	0.0
1		18.5	19.0
2		24.8	25.6
3		31.0	32.1
4		36.9	38.3
5		40.2	41.9

Tab. 5b. Zeit bis zur ersten Progression (CI) für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. im Zeitraum 1998-2019 (N=299) mit gesamter Anzahl von Progressionsereignissen (Events) und von Todesfällen als konkurrierendes Risiko (konkurr.).




Abb. 5c. Beobachtetes Überleben ab erster Progression für 268 Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. aus den Diagnosejahrgängen 1998 bis 2019. Diese 268 Patienten, für die ein klinischer Hinweis auf ein Progressionsereignis im Krankheitsverlauf vorliegt, entsprechen 55,9 % der 479 ausgewerteten Personen (einschl. M1, n=180, 37,6 %). Nicht berücksichtigt sind 25 Patienten (5,2 %), bei denen die Progression dem Register erst mit der Todesbescheinigung bekannt wurde.

Die Dokumentation besitzt häufig nicht die sprachliche Schärfe, um bei soliden Tumoren Lokalrezidive, regionäre Lymphknotenrezidive und Metastasen als Ereignisse unterscheiden zu können. Häufig ist auch „nicht spezifiziert“ zu registrieren. „Alle Progredienten“ sind Patienten, bei denen mindestens ein Ereignis im Krankheitsverlauf bekannt ist (einschl. primärer M1-Befunde). Die Anzahl der tatsächlichen Progressionen wird dabei unterschätzt. Lokalrezidive oder Metastasen sind Ereignisse, deren Summe größer als 100 % ist, weil mehrere Ereignisse im Verlauf auftreten können, ein Patient also in mehreren Kurven berücksichtigt werden kann.

Progressionsform	
Alle Progredienten n=268	
Jahre	%
0	100.0
1	73.5
2	61.4
3	48.7
4	42.6
5	36.4
6	32.4
7	28.5
8	28.5
9	26.2

Tab. 5d. Beobachtetes Überleben ab erster Progression für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. im Zeitraum 1998-2019 (N=268).




Abb. 5e. Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für 244 Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. aus den Diagnosejahrgängen 1989 bis 2019 nach Zeitraum Progression.

Zeitraum Progression		
Jahre	1998-2006	ab 2007
	n=44 %	n=190 %
0	100.0	100.0
1	72.7	70.2
2	56.8	57.2
3	45.5	43.6
4		37.2
5		30.6
6		27.4

Tab. 5f. Beobachtetes Überleben ab erster Progression (Fernmetastase) für Patienten mit neuroendokr. Pankreastu. im Zeitraum 1989-2019 nach Zeitraum Progression (N=244).

Abkürzungen

TRM	Tumorregister München	
NCI	National Cancer Institute, USA	
SEER	Surveillance, Epidemiology, and End Results, USA	
UICC	Union for International Cancer Control, Genf	
DCO	Death certificate only	Diagnose ausschließlich aus Todesbescheinigung bekannt
k.A.	Keine Angabe	
o.n.A.	Ohne nähere Angabe	
OS	Overall/Observed Survival	Gesamtüberleben/beobachtetes Überleben (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn: Erstdiagnose Ereignis: Tod (alle Ursachen)
RS	Relative Survival	Relatives Überleben, relativ zur „Normalbevölkerung“, Quotient aus beobachtetem und zu erwartendem Überleben (Ederer II-Methode), Schätzung für das tumorspezifische Überleben
AS	Assembled Survival	Zusammengesetzte Darstellung des beobachteten, erwarteten, relativen Überlebens
CS	Conditional Survival	Konditionales Survival Überlebenswahrscheinlichkeit unter der Bedingung, einen bestimmten Zeitraum überlebt zu haben
TTP	Time to Progression	Zeit bis erste Progression Beginn: Erstdiagnose Ereignis (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression
1-KM		1 minus Kaplan-Meier-Schätzer („umgekehrter“ Kaplan-Meier-Schätzer)
CI		Kumulative Inzidenz Tod als konkurrierendes Ereignis (nach Kalbfleisch und Prentice)
PPS	Post-Progression Survival	Überleben ab erster Progression (Kaplan-Meier-Schätzer) Beginn (Progression): erste(s) Lokal-, Lymphknotenrezidiv, Metastase oder unspezifische Progression Ereignis: Tod (alle Ursachen)

Empfohlene Zitierweise

Tumorregister München. Überleben P-NET: Neuroendokr. Pankreastu. [Internet]. 2020 [aktualisiert 19.10.2020]. Abrufbar von: <https://www.tumorregister-muenchen.de/facts/surv/shPNETG-P-NET-Neuroendokr.-Pankreastu.-Survival.pdf>

Autorenrechte

Der Zugang zu den vom Tumorregister München im offenen Internet bereitgestellten Inhalten ist weltweit verfügbar und kostenfrei. Die Dokumente dürfen unter Benennung der Urheberschaft frei heruntergeladen, genutzt, kopiert, gedruckt oder verteilt werden.

Haftungsausschluss

Das Tumorregister München übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der im Internet bereitgestellten Inhalte.